vrai, sur les rochers de la Baumette. Bref, dans une herborisation faite la veille du premier de l'an j'ai pu recueillir une quarantaine d'espèces des champs. La plupart n'étaient sans doute que le contingent attardé de la saison qui s'éteint, Ranunculus repens, Fumaria muralis, Dianthus Armeria, Malva sylvestris, Geranium divers, Sedum Cepæa, Centaurea Jacea, Ammi majus, Matricaria Chamomilla et inodora, Borrago officinalis, Thymus Serpyllum, Lamium amplexicaule.

Mais plusieurs aussi appartenaient réellement à la végétation nouvelle, comme Ficaria, Draba verna, Viola odorata, Primula acaulis, Vinca major. Certaines mares étaient à la surface toutes blanches de Batrachium, comme plusieurs bassins en plein air le sont d'Aponogeton distachyum, au milieu des Lemna qui n'ont pas disparu. Inutile de dire que les Ajoncs n'ont cessé de revêtir nos landes de leur parure dorée : les Ulex nains se sont attardés jusqu'à l'apparition en masses superbes de l'U. europæus.

Cette liste pourrait s'allonger notablement si l'on y joignait les divers cas de refloraison automnale : ainsi l'on pouvait voir dans nos platebandes en décembre un pied remarquable d'Asphodelus microcarpus rapporté d'Hyères et littéralement couvert de fleurs.

Mais je m'arrête ne voulant pas abuser de l'attention de nos confrères dans le cas où vous jugeriez à propos de leur communiquer cette lettre.

M. Lutz, à la suite de ces communications, présente en son nom personnel les remarques suivantes :

Floraisons anormales dans la région parisienne;

PAR M. LUTZ.

Le Midi de la France et la région, privilégiée au point de vue thermométrique, d'Angers n'ont pas cet hiver le monopole des floraisons anormales.

Dans les jardins de Nogent-sur-Marne j'ai noté en ces premiers jours de janvier la floraison de : Centranthus ruber var. blanche, diverses variétés de Roses, Callistephus sinensis var. hort., Matthiola græca, Viola rhotomagensis, Viola odorata, Arabis alpina, Mercurialis annua, Petroselinum sativum, Helichrysum bracteatum, Poa annua, Sonchus oleraceus, Viburnum Tinus, Calendula vulgaris, Primula divers, Cheiranthus Cheiri, Anthemis et Chrysanthèmes.

Sur les talus du chemin de fer de Vincennes j'ai observé quelques fleurs de Tussilage.

A Faremoutiers (S.-et-M.), le 26 décembre, j'ai pu cueillir des fleurs d'Astrantia major et des Ficaria ranunculoides. Le Daphne Laureola était en pleine floraison.

Dans le jardin botanique de l'École de Pharmacie de Paris, j'ai relevé

la liste suivante des plantes en fleurs:

Nardosmia fragrans, Pyrethrum inodorum et P. Parthenium, Helichrysum bracteatum, Cheiranthus Cheiri, Arbutus Andrachne L., OEillet var. hort., Grindelia robusta, Erica mediterranea, Calceolaria rugosa, Ruta graveolens, Antirrhinum majus, Daphne Mezereum, Helleborus fætidus, H. viridis, Brassica Rapa, Heuchera americana L., Saxifraga crassifolia.

Sans compter bien entendu les plantes habituellement fleuries en cette saison, telles que Helleborus niger, Corylus Avellana, Chimonanthus

fragrans, Jasminum nudiflorum, Senecio vulgaris, etc.

Enfin dans mon jardin de Nogent-sur-Marne j'ai observé en boutons prêts à s'ouvrir : Narcissus Pseudonarcissus et Hepatica triloba en avance de plus d'un mois sur leur époque normale d'épanouissement.

Quelques-uns des membres présents citent également des cas analogues.

M. Luizet fait la communication suivante:

Réponse aux observations de M. Rouy, concernant le Saxifraga Prostiana Ser. et le Saxifraga pubescens Pourr.;

PAR M. D. LUIZET.

Les débats, motivés par des divergences d'appréciation personnelle, ne présentent qu'un très faible intérêt, quand ils ne portent pas sur des questions de fond, mais sur des questions de forme. La science n'avancera pas plus, par l'adoption ou le rejet du Saxifraga Prostiana Ser., que par l'adoption ou le rejet du Sax. pubescens Pourr. J'aurais donc pu me dispenser de répondre aux observations de M. Rouy. Mes articles n'ont pas été publiés uniquement pour défendre telle ou telle dénomination que j'ai cru devoir adopter, mais surtout pour présenter de faits nouveaux, faire la lumière et établir l'ordre, partout où régnaient l'obscurité et la confusion dans la section des Dactyloides.